



Patientvejledning:

Udredning for celleforandringer på livmoderhalsen (portio/cervix).

Ved mistanke til celleforandringer på livmoderhalsen (forandringer i celleprøve (smear), visse typer blødningsuregelmæssighed, udredning/behandling for barnløshed, ved tilstedeværelse af kønsvorter mm) udredes med:

Kolposkopi.

Kikkertundersøgelse af livmoderhals før og efter pensling med 3% eddikesyre.

Portiobiopsier.

Udtagelse af vævsprøver fra ydre livmoderhals. Ofte tages 4 vævsprøver.

Cervixcytologi

Udtagelse af celleprøve fra indre livmoderhals (endocervikal cytologi). For at muliggøre undersøgelsen er det af og til nødvendigt forud at udvide livmoderhalsen.

Hvad kan undersøgelsen medføre (bivirkninger/komplikationer)?

Ubehag ved undersøgelsen. Blodigt udflåd/blødning fra skeden – typisk 1-2 dage efter undersøgelsen. Jeg anbefaler at du undgår karbad, svømmehal, brug af tampon samt samleje uden kondom indtil blødningsophør.

Hvad sker hvis jeg fravælger undersøgelsen?

Øget risiko for at evt. celleforandringer overses/udvikles til livmoderkræft.

Som smertestillende og for at nedsætte blødning efter indgrebet tilbydes lokalbedøvelse med 1 ml Citanest-Octapressin® eller tilsvarende. Det kan desuden være en god idé at tage 1g Panodil 1-2 timer inden proceduren.

Undersøgelserne forudsætter, at patienten ud fra oplysninger om formål og procedure giver sit samtykke.

Med venlig hilsen Lars Alling Møller