



Patientvejledning:

Udredning for celleforandringer på livmoderhalsen (portio/cervix).

Ved mistanke til celleforandringer på livmoderhalsen (forandringer i celleprøve (smear), visse typer blødningsuregelmæssighed, udredning/behandling for barnløshed, ved tilstedeværelse af kønsvorter mm) udredes med:

Kolposkopi.

Kikkertundersøgelse af livmoderhals før og efter pensling med 3% eddikesyre.

Portiobiopsier.

Udtagelse af vævsprøver fra ydre livmoderhals. Ofte tages 4 vævsprøver.

Cervixkrab.

Udtagelse af vævsprøve fra indre livmoderhals. Af og til kan det være nødvendigt forinden at udvide livmoderhalsen.

Hvad kan undersøgelsen medføre (bivirkninger/komplikationer)?

Ubehag ved undersøgelsen. Blodigt udflåd/blødning fra skeden 1-2 dage efter undersøgelsen.

Hvad sker hvis jeg fravælger undersøgelsen?

Øget risiko for at evt. celleforandringer overses/udvikles til livmoderkræft.

Som smertestillende og for at nedsætte blødning efter indgrebet tilbydes lokalbedøvelse med 1 ml Citanest-Octapressin®. Det kan desuden være en god idé at tage 1g Panodil 1-2 timer inden proceduren.

Undersøgelserne forudsætter at patienten ud fra oplysninger om formål og procedure giver sit samtykke hertil.

Med venlig hilsen Lars Alling Møller