



Patientvejledning:

## **Udredning for celleforandringer/kræft i livmoderen.**

Ved mistanke til celleforandringer i livmoderen (visse typer blødningsuregelmæssighed, blødning fra skeden mere end 12 mdr. efter ophør af menstruationer, ved mistanke i forbindelse med gynækologisk undersøgelse/ultralydsscanning mm) udredes med:

### **Ultralyd.**

Ultralyd undersøgelse af livmoderen – specielt udseende af slimhinde (endometrie) og muskulatur (myometrie). Ved uregelmæssigt afgrænset livmoderslimhinde, mistanke om forandringer i livmoderslimhinden f.eks. polypper eller muskelknuder og/eller ved livmoderslimhinde >4 mm bredde hos kvinder med blødning fra skeden mere end 12 mdr. efter ophør af menstruationer suppleres med kontrastscanning. Ved kontrastscanning indføres via et tyndt sugerør i livmoderen 10-20 ml. sterilt saltvand. Herefter gentages ultralyd undersøgelsen.

### **Vævsprøve.**

Ved uafklaret blødningsproblematik, ved uregelmæssigt afgrænset livmoderslimhinde og/eller ved livmoderslimhinde >4 mm bredde hos kvinder med blødning fra skeden mere end 12 mdr. efter ophør af menstruationer tages vævsprøve ("sugeprøve").

### **Hvad kan undersøgelsen medføre (bivirkninger/komplikationer)?**

Ubehag ved undersøgelsen. Blodigt udflåd/blødning fra skeden – typisk 1-2 dage efter undersøgelsen. Meget sjældent underlivsbetændelse. Du anbefales at undgå karbad, svømmehal, brug af tampon samt samleje uden kondom indtil blødningsophør.

### **Hvad sker hvis jeg fravælger undersøgelsen?**

Øget risiko for at evt. celleforandringer overses/udvikles til livmoderkræft.

Som smertestillende tilbydes lokalbedøvelse med 1 ml Citanest-Octapressin® eller lignende. Det kan være en god idé at tage 1g Panodil 1-2 timer forud for eller efter proceduren.

Undersøgelserne forudsætter, at patienten ud fra oplysninger om formål og procedure giver sit samtykke hertil.

**Med venlig hilsen** Lars Alling Møller