



Patientvejledning:

Udredning for celleforandringer/kræft i livmoderen.

Ved mistanke til celleforandringer i livmoderen (visse typer blødningsuregelmæssighed, blødning fra skeden mere end 12 mdr. efter ophør af menstruationer, ved mistanke i forbindelse med gynækologisk undersøgelse/ultralydscanning mm) udredes med:

Ultralyd.

Ultralyd undersøgelse af livmoderen – specielt udseende af slimhinde (endometrie) og muskulatur (myometrie). Ved uregelmæssigt afgrænset livmoderslimhinde og/eller ved livmoderslimhinde > 4 mm bredde hos kvinder med blødning fra skeden mere end 12 mdr. efter ophør af menstruationer suppleres med **kontrastscanning**. Ved kontrastscanning indføres via et tyndt sugerør i livmoderen og 10-20 ml. lokalbedøvende væske (1% lidokain). Herefter gentages ultralyd undersøgelsen.

Vævsprøve.

Ved uafklaret blødningsproblematik, ved uregelmæssigt afgrænset livmoderslimhinde og/eller ved livmoderslimhinde > 4 mm bredde hos kvinder med blødning fra skeden mere end 12 mdr. efter ophør af menstruationer tages vævsprøve ("sugeprøve").

Hvad kan undersøgelsen medføre (bivirkninger/komplikationer)?

Ubehag ved undersøgelsen. Det kan være en god idé at tage 1g Panodil 1-2 timer inden proceduren.

Blodigt udflåd/blødning fra skeden 1-2 dage efter undersøgelsen. Meget sjældent: underlivsbetændelse.

Hvad sker hvis jeg fravælger undersøgelsen?

Øget risiko for at evt. celleforandringer overses/udvikles til livmoderkræft.

Som smertestillende og for at nedsætte blødning efter indgrebet tilbydes lokalbedøvelse med 1 ml Citanest-Octapressin®.

Det kan desuden være en god idé at tage 1g Panodil 1-2 timer inden proceduren.

Undersøgelserne forudsætter at patienten ud fra oplysninger om formål og procedure giver sit samtykke hertil.

Med venlig hilsen Lars Alling Møller